



Dr.

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
—			2
vragen naar / e-mail	telefoonnummer	datum	
Geert Top / geert.top@wvg.vlaanderen.be	02 553 35 85	21 december 2006	

Betreft: pneumokokkenvaccinatie bij zuigelingen: gratis vaccins vanaf januari 2007

Geachte collega,

In de brief van eind oktober 2006 werd informatie gegeven over het aangepaste vaccinatieschema voor 2007 en de plaats van het pneumokokkenvaccin hierin, in overeenstemming met het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) hierover. **Vanaf januari 2007 wordt dit vaccin gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid. Het vaccin tegen pneumokokken (Prevenar®) kan vanaf 2 januari dan ook besteld worden samen met de andere vaccins van het basisvaccinatieschema.** Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks in Vaccinnet (met registratie in de vaccinatiedatabank), maar kan voorlopig ook nog op de gewone manier, liefst via e-mail, bij de Afdeling Toezicht Volksgezondheid in uw provincie (de vroegere Gezondheidsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap).

Plaats van het pneumokokkenvaccin in het vaccinatieschema 2007

Het nieuwe advies stelt voor om te vaccineren volgens een schema met **drie dosissen pneumokokkenvaccin (op de leeftijd van 2, 4 en 12 maand)** en om tezelfdertijd ook alle kinderen jonger dan 2 jaar zo snel mogelijk adequaat te vaccineren. Om epidemiologische redenen wordt de pneumokokkenvaccinatie best zo vroeg mogelijk afgerond. Daarom wordt voortaan de boosterdosering van het pneumokokkenvaccin aanbevolen op de leeftijd van 12 maand (gelijktijdig met MBR) in plaats van 15 maand. Parallel hiermee wordt het vaccin tegen meningokokken van serogroep C samen met het hexavalent vaccin toegediend op de leeftijd van 15 maand in plaats van 12 maand. Er is voldoende wetenschappelijke evidentie dat deze vaccins gelijktijdig mogen toegediend worden.

Na de vaccinatiecampagne tegen meningokokken van serogroep C van eind 2001 tot eind 2004, komen er nog zeer weinig meningokokkeninfecties van serogroep C voor. In 2005 werden er slechts vijf bewezen gevallen van infecties door meningokokken van serogroep C geregistreerd in Vlaanderen, waarvan geen enkel bij personen jonger dan 25 jaar. Daarom stelt een verschuiving van deze inenting van de leeftijd van 12 maand naar 15 maand geen probleem.

De pneumokokkenvaccins die gratis ter beschikking gesteld worden van de vaccinatoren, mogen in een eerste periode ook gebruikt worden om inhaalvaccinaties aan te bieden aan kinderen jonger dan 2 jaar die nog niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. **Kinderen van 12 tot 23 maand die nog geen vaccin gekregen hebben, hebben slechts één vaccin nodig.** Hierna volgt het inhaalschema voor de verschillende situaties.

Inhaalvaccinaties tegen pneumokokken: afhankelijk van de leeftijd en het aantal vaccins dat al gegeven werd.

- **Kinderen jonger dan 1 jaar die al 2 vaccins gekregen hebben met minstens 4 weken tussentijd**, krijgen enkel nog een boosterdosering op de leeftijd van 12 maand (of minstens 6 maanden na de tweede dosering).
- **Kinderen jonger dan 1 jaar die nog maar 1 vaccin gekregen hebben**, krijgen één vaccin, 8 weken na het eerste, en een boosterdosering op de leeftijd van 12 maand (of minstens 6 maanden na de tweede dosering).
- **Kinderen jonger dan 10 maand die nog geen vaccin gekregen hebben**, krijgen 2 vaccins met 8 weken tussentijd en een boosterdosering op de leeftijd van 12 maand (of minstens 6 maanden na de tweede dosering).
- **Kinderen van 10 en 11 maand die nog geen vaccin gekregen hebben**, krijgen één vaccin vóór de eerste verjaardag, gevolgd door een boosterdosering 6 maanden later.
- **Kinderen tussen 12 en 23 maand die nog geen vaccin gekregen hebben**, krijgen één vaccin
- **Kinderen tussen 12 en 23 maand die al één of meer vaccins gekregen hebben vóór ze één jaar werden**, krijgen één vaccin (minstens 6 maanden na de vorige dosering).

Vaccinatieschema Vlaanderen 2007

leeftijd	IPV-DTP _a -Hib-HBV	Pnc-7	MBR	MenC	IPV-DTP _a	HBV	Td
2 maand	X	X					
3 maand	X						
4 maand	X	X					
12 maand		X	X				
15 maand	X			X			
6 jaar					X		
10 jaar			X				
12 jaar*						XXX	
14 jaar							X

* enkel voor wie nog niet eerder gevaccineerd werd tegen HBV – 3 dosissen (1^{ste} jaar secundair onderwijs)

Volgende vaccins kunnen nu via Vaccinnet of bij Toezicht Volksgezondheid in uw provincie besteld worden:

- IPV-DTP_a-Hib-HBV Infanrix Hexa
- Pnc7 Prevenar (nieuw in 2007)
- MBR M-M-R VAX
- MenC NeisVac-C
- IPV-DTP_a Tetravac
- HBV HBVAXPRO (Junior, 5µg/0,5ml)
- Td Tedivax pro adulto
- IPV Imovax polio (als combinatievaccins niet kunnen - geen reisgeneeskunde)

De volledige adviezen van de HGR en de gecommuniceerde vaccinatiekalender kunt u vinden op de website van de HGR. Ze zijn ook te vinden op de onlangs vernieuwde vaccinatiewebsite van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: <http://www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatie.aspx> bij de informatie voor professionelen. Daar kunt u zich ook inschrijven voor een elektronische nieuwsbrief.

Als bijlage bij deze brief vindt u ook een blad met het basisvaccinatieschema Vlaanderen 2007 en de adressen van de afdeling Toezicht Volksgezondheid en een blad met een bestelformulier voor vaccins in 2007. Deze documenten kunt u ook downloaden van de vaccinatiewebsite van het agentschap.

Met vriendelijke groeten,

dr. Dirk Dewolf
afdelingshoofd

dr. Geert Top
teamverantwoordelijke infectieziekten